

4967
c. 2

D. A. G.
DE
SUTURIS VULNERUM
IN GENERE;

172

Quas,
Conf. Nob. Fac. Med. Upſal.

PRÆSIDE,
Viro Illustri & Generofissimo,

D. D. CAROLO à LINNÉ,

S. R. M. ARCHIATR. EQ. AUR. DE STELLA POL. MED. ET BOTAN. PROF. R. O.
ACAD. PAR. PETROP. IMP. N. C. HOLM. UPS. LOND. ANGL. FLOR.
BEROL. MONSP. TOLOS. BERN. EDINB. NIDROS. CELL.
PHILADELPH. ZELAND. MEMB.

H. T. RECT. MAGNIFICO,

DISSERTATIONE INAUGURALI MEDICA

In Aud. Car. Maj. D. XXVII. Jun. A. MDCCCLXXII,
Horis A. & P. M. Solitis.

Exhibit Author

CHRISTIAN ERN. BOECLER,

Stip. Siegl.
Acad. Upſal. CHIRURG. ORDIN.

UPSALIAE,
Typis EDMANNIANIS.

1772

REGIÆ ACADEMIÆ UPSALIENSIS.

CANCELLARIO.

ILLUSTRISSIMO. EXCELLENTISSIMO.

PROCANCELLARIO.

REVERENDISSIMO. EMINENTISSIMO.

RECTORI.

MAGNIFICO,

SENATUIQUE ACADEMICO.

AMPLISSIMO.

SACRUM.



Experientia optima rerum Magistra.

§. I.



uæ manu sanat Medicina ^a), in duo summa discedit capita, quorum alterum DURIORUM; alterum MOLLIUM corporis humani partium vitia exponit ac tollit. Hæ iterum commode in TUMORES & VITIA CONNEXIONIS: SOLUTIONES CONTINUI, dispescuntur, quarum, quæ vi externa facta, VULNUS, erosione vero ULCUS vocantur. Plures, ob relationes diversas, vulnerum sunt divisiones: Generalissima, eorum respi- ciens symptomata, in SIMPLICIA & COMPOSITA s. COMPLICATA; pro diverso autem modo, quo inferruntur, in tria abeunt genera 1. PUNCTA, 2. IN-

A 2

CI-

^a) Medicinæ veram esse partem ita probat Celsus: Iisdem temporibus in tres partes Medicina diuincta est: ut una esset quæ victu: altera, quæ medicamentis: tertia, quæ manu mederetur. *Corn. Celsus de Medicina Praef. Libr. I. p. 3. edit. Almeloveen.* Ab antiquissimis retro temporibus fuit exercitata. cfr. *Boerhaave Stud. Medic. ab Illustr. Hallero editum 1759. p. 709. ad 713. a*); & opera pervolentes Medicinæ paren-

tis Hippocratis, observamus eum Chirurgica præcepta nequam esse a- spernatum: Varia enim Chirurgiæ pertractavit capita ex. gr. *De Vulneribus capitis. De Ulceribus, De Fistulis, De Fracturis, De Articulis &c.* Vide Hippocrat. oper. omn. Id eoque Medicinæ partes ita connexæ sunt, ut ex toto separari non possint: sed ab eo nomen trahant a quo plurimum petunt. *Corn. Celsi Libr. cit. in præfar. L. V.*

CISA & INFILCTA, 3. CONTUSA b). Hæc divisio ad priorem proxime accedit c). Vulnerum quatuor et jam observantur tempora: 1. *Hæmorrhagia*, 2. *Suppuratio-*
nis. 3. *Incarnationis*, 4. *Cicatricis*.

INCISA & INFILCTA, *Simplicia* scilicet, præ ceteris, hæmorrhagiæ tempore in primis, ob celeriorem consolidationem, posunt suturas. Quid in reliquis vulnerum temporibus Chirurgo sit observandum, tradere jam non attinet.

Viam mihi ita sternere volui ad indicandum, cuinam vulnerum generi, quoquo tempore, per suturas sic succurrentum, ut pensum de suturis vulnerum partium Humanæ corporis mollium in genere suscepimus absolvamus.

Benigniorem mibi, L. B. expeto censuram, si non satis elaboratum inveneris opusculum, quod, diro admodum morbo virium pastus jacturam & nunc primum convalescens incepi, & exteris jam b. c. D. petiturus terras, festinanti calamo perfidere cogor.

§. II.

SUTURA d). Encheiresis est chirurgica, qua vulneris labia, ad consolidationem promovendam & deformitatem cicatricis cavendam, uniuntur. Artis Autores plurimi suturas in *siccas* & *cruentas* dividunt; siccæ nominant aliqui spuriæ e), cruentam veram. In-

fim.

b) Huc etiam nonnulli referunt
VENENATA; sed quoniam sub pri-
oribus qua viu illatam commode per-
tractari possunt, COMPLICATIS re-
stus eadem adnuero.

c) cfr. *Nobil. Doct. & Chir.*
Prof. Ol. Acrel. Afhandling om
friska sår p. 18. & 20. sequ. Binas
tantum attuli vulnerum partitiones,
quoniam sufficiunt ad ostendendum,

quænara cruentæ mollium partium
solutiones futuris sunt administran-
dæ.

d) Medelarum respectu, Chir-
urgia in duas distinguitur partes;
altera, quæ medicamentis, altera quæ
manu ægratis fert operam; hæc iterum
quæ manu sola, vel instrumentis o-
peratur.

e) Sed minus adæquate sic-

simplices etiam & compositas a nonnullis distinguuntur.

Sequens vero mihi magis aridet suturarum partitio, quam etiam heic tradam. In duas apte distribuuntur ordines.

{ Ord. 1. Sutura Incarnativa

{ Gen: Sut. Sicca.

{ Gen: Sut. Cruenta.

{ Sp. Nodosa,

Clavata.

Involuta.

{ Ord. 2. Sutura Restrictiva.

{ Gen: Enteroraphia.

Ligatura vasorum.

§. III.

Ordo I. SUTURA INCARNATIVA.

G. SUTURA SICCA f), ubi, emplastro tenaciter adhaerenti, supra linteum vel alutam extenso, ut inde variæ figuræ discindantur frusta, vulneris adunantur labia. Alterutri vel utrique margini emplastri, vulneri adaptandi, veterum alii tenuissima ligamina, alii uncinulos g) insuendo adnæstebant, ut vel ligando, vel filamento fortiori uncinulos ab utraque parte leniter constringendo, labia vulneris, quantum necesse, con-

cani votant spuriam; omnino enim
vera est, quatenus sibi obtinendo
satisfacit.

f) Impropræ hæc vulneris conjungendi ratio futura ab autoribus dicitur,

ob usum cum ercent communem.
Emplasta usitata sunt Empl. Stict.
Humbe. Diachyl. c. gom. Polyclr.
Schyz. &c. g) Vid. HELSTÈRE
CHIRURG. Tab. IV. Fig. 8, 9, 10.

jungerent, atque adeo commodius vel adstringerent vel laxarent, pro vulneris habitu.

Cum vero nodi tæniarum & ipsi uncinuli, facta constrictione, vulneris premerent margines, maxime si fascia uniente superinjicienda opus esset, &, suppurante largius vulnere, ad singulas innovationes, talia operose præparata esse deberent emplastra, tæniis aut uncinulis instructa; ista jam dudum in usu esse desierunt.

Nostro tempore, emplastro viscido linteis illito, simplices inde forfice absinduntur laciniæ, pro vulneris majori minorive amplitudine *), vel in medio ab utraque parte ope lunatulæ **) incidendo redundunt angustiores, ut si plures simul fuerint applicandæ, gracilior hæc pars laciniarum vulneri admoveatur, ne oblinimentis suppurationis prorsus impediatur effluxus, sicque pus inclusum calore facile degeneret, quod non tantum curationem impedit, sed vulneris hoc modo ulterius neglegendum in ulcus abire facit. Hinc in vulneribus obligandis pars declivior, ob fluxum puris, libera est relinqua, quod in cura vulnerum generatim quoque est observandum. Emplastris D. PETIT ***) usus est fenestratis, quæ, ceteris saepius mutatis, remanere poslunt; nisi largior suppurationis hujus quoque mutationem postularet b).

Antequam vero hæc applicantur, aliquantum sanguinis e vulneri recenti defluere permittat Chirurgus, ut lenior evadat inflammatio. Si justo major fuerit haemorrhagia,

*) l. c. fig. 5.

**) l. c. fig. 3. 4.

***) HEIST. Chir. l. c. fig. 7.

b) Commendat RAVATON, de Vulneribus sclop. &c. p. 506. præceteris Emplastris, linteum, cui emplastrum glutinosum est illitum, in formam splenii gracilioris complicatum,

ita ut emplastrum intus maneat, præter ultimam plicaturam, ubi latus emplastro illitum extrorsum vertitur & cuti admovetur. Ejusmodi splenia ab utraque parte vulneri applicat & fascia unienti hiantia solutaria partium labia adunat.

rhagia, illa prius sistenda & coagula sanguinis crassiora, dígito tantum, methodo RAVATONIS ⁱ⁾, tollenda; nimis enim exacta lavatio novam facile excitat hæmorrhagiam, dolorem & inflammationem insequentem, alia ut taceam incommoda. Si quæ vulneri sint illapsa heterogenea, caute quoque extrahenda. Si pili in loco affecto fuerint, prius abradendi, ne emplastrum adhærens supervacuum ægroto in mutationibus adferat dolorem; cuti etjam pilis orbatae melius adhærescit emplastrum. Vulneris labia exacte naturali situ sibi respondentia adducantur.

Adhibetur hæc sutura generatim in vulneribus non admodum profundis, velut in facie, ubi, ex præscripto autorum, hac maxime utendum, ut cum dolore evitentur cicatrices suturam cruentam infecuturæ. In profundioribus etjam, sed longitudinalibus, hæc cum spleniis graduatis & fascia uniente sufficit. Suturæ quoque cruentæ multum opitulatur suffulciendæ, ne filamenta margines discindant vulneris, unde deformes cicatrices, ut FELIX WYRTZ memorat *).

Adplicatio k) fit hunc in modum: postquam labia in vulneribus minoribus ab ipso Chirurgo altera manu sunt adducta, imponitur emplastri, vulneris magnitudini adæquati antea ad *turibulum* ^{l)} calefactæ, extre-

i) *De Vuln. sclop. Incis. & punct. vers. germ. p. 512.*

*) cfr. Chirurgia p. 46.

k) Præteriti fortassis potuerat hæc encheiresis, ut simplicissima, lippis & tonsoribus nota, sed cum Chirurgiæ scriptores futuris hanc adnumerarunt, & ad vulnera consolidanda multum adserit utilitatis, prætermittere nolui.

l) Quod ad vulnera præsentim majora & profundiora obliganda semper adesse debet, ut in mutatione fasciarum, calore ær rarescat, sic que mitius in vulnus agat. Omnis aura frigida vulneri admissa, vasorum laceratorum adstringit fines, li. quorem alioquin deprimentes, quo natura vasorum elongationem fovet ac promovet, una cum intervenien-

wemitas alterutra, parti vulneris aversæ primum adfigitur, quam deinde quatuor alterius manus digitis junctim expansis, levi pressione apprimit, ac ad cohesionem firmorem retinet, usque dum leniore tractione apprehendit alteram dimidiæ emplastri partem alligaturam, pollice simul ejusdem manus, quæ extremitatem tenet primam affixam, alterum vulneris labium caute & adcurate adjungens priori, postea hanc etiam, ut dictum est, emplastri figit partem. Si vero amplius est vulnus, quam ut Chirurgus ipse vulneris labia adducere possit, dexter requiritur adjutor, qui expansis æquabiliter digitis, non tantum teneat alterum emplastri glutinantis limitem, atque leniter & adcurate ad se invicem comprimendo adducat labia vulneris: sed etiam eodem modo, alteras adhaerentis emplastri extremitates retineat; donec, quot requirit vulnus, sint adfixa. Ad novationes deligationis idem, quamdiu necessum videtur Chirurgo, etiam in futura cruenta observari debet. Post primam applicationem remanet vindicta, usque dum perfecte accelerit suppurationem. Quando sunt removenda, spongia & aqua frigida, emplastrorum limina, suadente PLATTNERO, humectanda, levi ad cutem tractu, fines primum, versus vulnus relaxari debent. His vero ad superficiem vulneris levatis, quod restat levi motu huc & illuc facto, demittitur; dum adjutor interea, ut dixi, suas peragit partes. Vulneris deligatio hoc peragitur modo, quamdiu suppuration durat & usque dum labia sauciatae partis reperiuntur coadunata. In sanatione labii leporini futuram in-

vo-

te tela cellulosa expansione, quæ per-
operam pro novo carnis generatione ac
rcepitur. cfr. PALUCCI methodus cu-
rand. Fist. lachr p. 64. & docte de
hac re, pro more suo differit Il-
lustriſſimus VAN SVETEN, In-

Comment. in BOERHAAVE Aphorism. 190. & huc quoque ra-
tio est, cur in amputationibus, & a-
liis operationibus, cuti, si fieri potest,
follicite parcatur.

volutam alioquin usitatam Dn. LOUIS non adhibet, sed futura sicca, & ope instrumenti in finem hunc inventi curationem perficit. Suturam sicciam plane sufficere D. FRANCO SYLVIUS existimavit. Sed in obliquis & transversalibus vulneribus, quæ musculorum profundius penetraverunt substantiam, finem, ut satis constat experientia teste, futura sicca non adsequitur; unde statim absque alio tentamine, ad cruentam configiendum est suturam.

§. IV.

SUTURA CRUENTA, alterum incarnativarum genus, est operatio Chirurgica, qua manu experta vulneris labia acu & appropriato filo ad faciliorem celeriterque consolidationem studio adunantur. Apte hoc quadrat illud GALENI:

Acia m) vulneribus commoda.

Comm. in HIPP. L. Kæt' ἵππεον.

Requiruntur acus usitatæ, diversæ magnitudinis, magis vel minus curvæ, etjam ex rectis crassiores & subtiles, omnes optimo præditæ mucrone, parte plana bene politæ & margines latitudine proportionata rite incidentes, ut foramen cum filo facile & cito transeat. Fila in hunc usum adhibenda, partim simplicia sunt ex serico vel linteo filamento, partim plura ex subtilioribus vel crassioribus filamentis, quæ cerata juxta se ponuntur, ut formam latioris aut angustioris tæniæ accipiant; tandem bene cerata allidendo levigantur n): & hæc pariter atque acus, pro inventa vulneris profunditate, eli-

B

gun-

m) *Acia* vocatur filum per acus foramen transjectum, quo ad invicem adducuntur oræ partis dissectæ Libr. 8 l. 6.

n) Ne putredo filamenta cito dissolvat, sed quam diutissime plana existant, (tertia enim fila facile perfecant), neque junctim tenacitatem amittant.

guntur. Acuarium o), Cylindri p), Splenia parva, quæ nodis subjiciuntur. Observatur ante applicationem, quod pars vulnerata ita collocetur, ut relaxati sint musculi q), & quantum fieri possit, ægrotus commode jaceat: sed ita tamen, ut Chirurgus in operando non impediatur. Ante omnia vero scire necessum est, ubi futura locum non habeat, quod ex parte constat ex dictis de Suturis in genere §. 2:da. Sic in incisis & inflexis complicatis sutura non est adhibenda, neque in simplicibus, quæ cum perditione substantiæ magna sunt conjuncta. PIBRAC & FABER de Sanatione vulneris cum substantiæ jactura r). Ubi magna arteria secta, primum illa subliganda est. Neque ubi ex Anatomia trajectus vasorum capitalium, nervorum &c. cognoscitur vicinus: Unde digito prudenter

o) Port aiguille Gallice, jam non usurpatur, aliquantum tamen habet commoditatis, si non in digitis Chirurgi satis est roboris, ad acum per fundum profundiorum vulnerum & ad eandem distantiam, qua ab altera parte inserebatur, ab altero & adverso margine per cutem tenacem & duram, adequare dirigidam. Hinc ejus usum approbat PLATTNER Chir. rat. §. §. 401. 711. HEIST. L. cit. Tab. VI. fig. 3. & 4.

p) Chevilles Gallice dicuntur; parantur e ligno pennæ anserinæ crassitie, quibus postea linteam emplastro viscido illitum super inducitur. Pennæ in casu necessitatis et jam adhiberi possunt. Meliora sunt, quæ ex tali linteo, ad eandem crassitatem arte convolvuntur, emplastro introrsum converso. Hæc vulnus non premunt, uti bacilli lignei vel pennæ, sed se se paulatim remittunt,

Cylindrorum ejusmodi emendationem a D:NO RAVATON factam, præ nominatis, valde probo, nempe ut foramen adsit, per quod filum trahatur, cuius deinde diffinditur extremitas, & adnectitur primum filamenti crassioris portiuncula, ne transeat nodus, deinde ansis duplicatis nettitur (en rosette); cetera, ut antea dictum. Utitur quoque breviori quodam Cylindro pro quavis sutura. L. cit. P. 4. Sect. I. Cap. 2. & Tab. 7. Fig. A.

q) Si tensio Musculi dissecti admodum fortis fuerit; e. gr. in vulnera extensorum vel flexorum femoris vel brachii athletici, possumus ope adjutorum, qui manibus apprehendant vulneris margines, donec sutura est applicata, cui fascia unius adjicitur, illos reducere.

r) Memoire de l' Academ. Royal de Chirurg.

ter explorandum vulnus, ne acu malum in pejus mutetur. Ligari non debent, quæ valde sunt inflammata, aut dudum suppurantia. Nec ubi os periostio est nudatum ^{s).} Neque in vulneribus longitudinalibus, ubi sutura sicca cum fascia uniente sufficit; neque in illis, quæ penetrarunt cavitatem, ut sanguis copiosior in illam effundatur. Observandum quoque, quid sutura cruenta, non secundum vulneris, sed secundum fibratum directionem dirigi debeat. Neque in vulneribus pectoris, ubi sutura vulneris labia, respirationis motu, facile per rumpit.

Contra in incisis & inflictis simplicibus sutura cruenta est applicanda, ubi in substantiam musculorum vulnus profunde penetravit; item ubi angulos habet aut laciniam; sic etiam in vulnere faciei ^{t),} e. gr. bucca transversum secta. In labiorum vulneribus, etiam si fuerint cum deperditione substantiae; remittere enim possunt. *vid infr. in futur. invol.* Vulnera musculi pectoralis acia ligantur: quamvis hic pectori incubet, non tamen est respirationis musculus; heic tantum requiritur, ut brachium non moveatur. In ligando videndum est, ne nimis constringantur fila, unde dolor & inflammatio oritur. Hinc filamentum ita negetendum, ut laxari possit, donec symptomata fuerint sedata, & postea caute, quantum satis, adstringi. Etiam heic observandam, §. 3. ut loco vulneris maxime declivi, post appli-

B 2

ca-

^{s)} Adhibuit nihilominus PLATT-
NER futuram cruentam, sed hac
tamen cum cautela, quod vulnera-
ratio nuper facta erat, & aer in
vulnera nullam produxerat mutatio-
nem, nec alia ederant contraindi-

cantia L. cit. §. §. 397. 405.

^{t)} DE LA MOTTE Chir.
Tom. 2. ohf. 182. &c. sed in ohf.
189. ubi in rustico ad obligandum
vulnus laciniosum faciei, novem fa-
ciendæ erant suturæ cruentæ.

catam suturam, molli & rara turunda lintei rasi immittitur, ne pus retineatur. Ubi adest tempus tollendi filamenta, cfr. RAVATON L. c. p. 579. nodi forfice acuminata caute abscondendi, & retrorsum versus vulnus extrahendi duos inter digitos, qui vulneri innitantur: & hoc modo unum post alterum, ut ratio vulneris permisit, extrahendum.

§. V.

In ordine cruentarum incarnativarum §. 2. prima species est SUTURA NODOSA, intercifsa, *Gall.* entrecoupée, *germ.* Knopfnath. Suturarum hæc species sæpe obvia. Quo heic profundius vulnus, eo magis curva & fortis erit acus, filoque capaci prædita. Ipsa encheirisis, quam concinne describit BERTRANDUS, sequenti instituitur modo: *Le Chirurgien pliant la premiere pbalange du doigt index & du doigt du milieu, formera un demi-canal dans lequels il posera son aiguille comme dans un sillon, de maniere que la plus grande moitié de l'aiguille soit du coté du doigt index; il tiendra le pouce sur la partie la moins courbe de l'aiguille - - - il appuiera les deux derniers doigts sur la partie, portera son aiguille sur une des lèvres, pénétrant obliquement & peu à peu jusques dans son fond: alors il appliquera la main gauche à plat sur l'autre lèvre pour la tenir plus ferme, & fera sortir l'aiguille de l'autre côté par le fond de la solution de continuité, & à égale distance.* Traité des operations de Chirurgie p. 3. 4.

Ut fundus vulneris sutura comprehendatur, necessarium est. Hujus enim rei intermissæ exempla adducit FELIX WYRTZ L. cit. quod nempe vulnus in superficie fuerat sanatum, & in quantum oræ ope suturæ erant coadunatae: sed pus impedito effluxu in fundo collectum, cellulofam penetrando, sinuositates efficiebat; quæ per incuriam ulteriore in fistulam degenerabant. Ulterius ob-

observandum, quod quo profundius sit vulnus, eo latius a margine vulneris, usque ad latitudinem pollicis, fiat acu pertusio. Hæc vero prima fit ex BERTRANDI præscripto: *Le premier point de future doit toujours se faire à la partie la plus mobile du Muscale . . . L. cit. p. 4.* Si plures ejusmodi vulnus futuras postulat, æqualis inter illas sit distantia; in majoribus vulneribus latum pollicem & supra, in facie propiores. Omnes acus iugis SOLINGIUS primum immittit, quotquot ad consolidationem vulneris requiruntur; dein connectitur media quæ primum applicatur. *) PLATTNER ordinis earum nullam habet rationem, sed connectit primum, ubi ora maxime distant L. c. §. 401. Filis applicatis, nodus fit dupli convolutione, non super vulnus, sed ab alterutro latere vulneris, si perpendicularare fuerit; at si obliquum aut transversale, a parte superiori. Parvum splenium subjicitur ante primam adstrictionem; dum filamenta applicantur, adstrictio fit, labia interim ab adjutore conjuguntur: tandem nodi necuntur solubiliores. LEVRET **) hanc adhibet in ruptura perinæi parturientium & eam vocat *future rectovaginale*. CORN. CELSUS ***) hac futura vulnera abdominis ligavit: sed cum facile elidi possit, clavata jam est in usu. In vulneribus angulatis, ligatura in angulis primum instituitur.

In utroque satis longi fili extremo adhiberi potest acus, quod in *gastrorapbia* fieri solet, ubi utraque illarum ligatur utrumvis vulneris latus, a fundo extorsum. Si nodosa sine elisione effectum non præstare intelligitur, sequens ut magis sustentans adhibeatur futura.

SUTURA FIBULATA, clavata, pennata, Gallis en-

B 3

che-

*) Ejusdem manuale operationi
der Chirurgie. Pars 4ta Cap. 12.

**) Ejusdem *L'art d'accouche-*
ment. p. 23.
***) L. VII. cap. 16.

chevillée, ou enplumée; germ. Zapfen nath, Incarnativæ cruentæ altera species est. §. p. u). Hæc adhibetur in vulneribus admodum profundis *). Post adhibitionem diffinditur ligamen duplicatum, (si plura suis locis trajecta fuerint, omnia ab una primum parte dividenda), bifurcationi ejus injicitur bacillus vel cylindricum linteum §. p. cui extremitas fili nodo adnæctitur replicabili. Dum fibulæ, per filamina, quæ alterum oppositum transeunt vulneris marginem, adstringuntur, labia vulneris adducuntur, postea proceditur in ceteris, uti in sutura nodosa. Si hæc sutura in abdominis perficitur vulneribus, *Gastroraphia* audit. Si vulnus cavitatem simpliciter penetravit, ligatur: sed si tubi intestinalis quædam pars simul fuerit læsa, prius consuenda est ejus vulneris apertura. Cfr. infra de enteroraphia (§. 6.). Si prolapsum omentum sit nigrum & mortificatum, in viva ligandum parte, jubent autores quidam, alii vero improbant.

Una, vel rectius dupliei ab utroque fili complicati (§. 4.) extremo, acu forti & curvata, ad præscriptam GARENGETI de *Gastrorapb.*, adapplicationis maturandæ causâ. Extensis junctim digitis alterius manus elevatur margo vulneris jam ligandus, & versus apicem digitæ indicis occultatur mucro acus, ne quod viscus, quando in cavitatem ingeritur, lœdatur. Antequam acus ad pertusionem admovetur, dissipciendum est, ut iunctus pollicis latitudine distet a margine, & simul peritoneum v) acu com-

u) DIONIS clavatam futuram rejicit; nous en supprimons comme trop cruelles & tout à fait inutiles &c. uti jacent verba: *Cours d'opérations de Chirurgie par de la FAYE*.

*) PALFYN. *Chir.* cap. 6. RAVATON L. cit. p. 507.

v) Peritonei non quidem inter se margines consolidantur PLATTNER L. cit. §. 704. *) Sed illud p. 60. 61. Sed contrariam recentium practicorum adfert sententiam de la FAYE, in not. a) ad hunc locum.

*) Nihilominus futura comprehendendum est, quia cicatrici externarum vulneris partium innexum, impedit

comprehendatur. Pergitur ab utraque parte ab interiore extrorsum, secundum hoc CELSI *): neque summæ cutis, neque interioris membranæ per se satis proficit, sed utriusque. Adhibetur etjam hæc sutura post operationem Cæsaream & Herniæ ventralis.

SUTURA INVOLUTA, tertia incarn. cruent. species etjam intorta, (*Gallice éntortillée*), vocatur. Acus heic rectas aliquantulum planas, auro prope mucronem incrassatas adhibent nonnulli: alii ex alio metallo confectas & bene auratas priorum loco applicant, etjam ex calybe: sed ex his x) non raro secuta est gangræna vulneris; præterea non tam facile extrahuntur. Hæc suturæ species in operat. Labii Leporini veri, etjam accidentalis, usurpatur.

Prout labium magis minusve est latum, duo vel tres adhibentur acus. Quarum prima, cessante fluxu sanguinis, infimo vulneris immittitur loco, ubi crassior illa exterior pars attingit ruborem labrorum, duas vel tres lineas a margine fauciato, ita quidem, ut interiorem fere labii tangant superficiem. Acubus immissis obducitur illa, quæ primum ingerebatur, filo primum circulariter *). dein flexuose vel decussatim **); acuum interstitiis glutinans applicatur emplastrum, utrisque acuum extremis supponuntur parva oleo imbuta spleniola, ne malis inferatur noxa, atque ut, ex præscripto multorum autorum, tollere non opus sit mucrones. Hinc longioribus & brevi-

molestiam, quam intestina alioquin sua efficerent pressione, herniam nempe ventralem fere inevitabilem. RA- VATONIS heic facta emendatio

507. 519.

*) *L. cit. L. VII. cap. 16.*

x) cfr. *Orat. D. Prof. OL. ACREL* duin alterum præsidium in Regia Academia scientiarum depo- neret, de operationibus Chirurgicis usitatæ suturæ præferenda. *L. cit. p.* abbreviandis.

*) *JUNK. consp. Chir.*

**) *HEIST. L. cit. T. IV.*

Fig. 21. 22.

oribus instrutus sit acubus Chirurgus, pro labii & vulneris indole. Si quæ substantiæ fuerit deperditio, absterre tamen nos non debet a consolidatione quærenda y).

Filum semper isti primum demitur acui, quæ vulneris continuit margines naso proximos, & acus simul extrahitur, non vero, ut vult GARENGEOT, per diem post evulum filum relinquitur; cum sic semper sit difficilior extractio.

Ne mireris peculiaria quædam non adduci de sutura z) tendinum.

Etenim rimo rejiciunt multi, alii commendant; ab antiquissimis temporibus GALENUS hanc improbat ob sensibilitatem tendinum; ex recentioribus QUESNAI *) nullam heic necessariam esse suturam contendit. RAVATON illam rejicit **) ut inutilem, dolorosam & noxiā. AVICENNA vero acia usus est felici successu, cui ELLER ***) & BILGUER in egregio, de vulneribus recentibus, Libro, album addit calculum.

2. Quo-

y) cfr. Prof. OL. ACREL *obs. Chir.* p. 23. CELSUS hoc subministrat consilium: id quod curtatum est in quadratum redigere, - - (Feli cum successu hoc fecutus est monitum b. m. & dum viveret Chirurgus dexterimus DN. HIERTZELL, cfr. easum in *Actis Academ. Scient. Holm.* 1756. p. 270.). Si non satis junguntur, ultra linens, quas ante fecimus alias duas lunatas, & ad plagam conversas imittere L. cit. L. VII. cap. 9. Omnia demum quæ suturam fulciunt, adhibenda, ut emplastrum glutinans, spleniola graduata, fascia uniens, quies ægroti. Nonnulli, ut GARENGEOT & ELLER hanc suturam in infantibus disfident; sed optimo successu usur-

pata fuit in infantibus decim hebdomadum, ut ROONHUYSEN in suis *obs. Chirurgicis* memorat; & Prof. Q. ACREL hanc in infante novem mensium adhibuit. cfr. *Act. Acad. Scient. Holm.* 1758. p. 159.

z) Acus, quæ heic adhibentur, curvæ quidem sunt, sed secantes parte concava & convexa, planæ vero ab uno latere ad alterum. Pertusio variis fit modis ab extra ad intra, ab intra ad extra, ab uno latere tendinis ad alterum. De Sutura tendin. fuse differit HEISTER. *Chir.* cap. 172.

*) *Trait. de gangr.* p. 160.

**) *L. cit.* p. 502.

***) *Chirurg.* p. 373.

2:do. Quoniam heic adhibetur sutura vel nodosa vel clavata, cum pluribus variationibus antea pertractatis.

§. VI.

Ordo II. SUTURA RESTRICTIVA.

ENTERORAPHIA hujus ordinis primum est Genus. Huic adnumeratur *sutura pellionum*, quæ jam exolevit a). Ejus vero locum *Ansata* in vulneratis intestinis obtinet. Si intestinum prodierit extra partium externalium vulnus, & simul ab eo incarceratum fuerit, ita suadet CELSUS: *Si angustius vulnus est, quam ut intestina refundantur, incidendum, donec satis pateat b).* Varia ad dilatandum abdominalis vulnus, dum incarcerat prolapsa intestina, sunt excogitata; ut specillum allatum, MORANDI forfex, bistouri Royal &c. Si in parte inferiori ventris est vulnus, sursum dilatandum, sed in parte superiori, deorsum c).

Si intestinum instrumento secante sine substantiæ delapidatione fuerit vulneratum, sutura obtinet ansata: quomodo collocari ægrotus debeat Celsus docet *). Margines intestini ad curate ad se invicem junguntur, atque ab altera parte tenentur molli linteo inter pollicem & indicem; Chirurgus eodem modo alteram tenet: sutura fit alterutra manu, prout commodum fuerit; acus heic recta, mucrone trifido sit instructa, filum simplex sericeum, æquabile, ceratum, longum.

Pertusio fit integra a margine linea, & inter singulos

C

a) GORTER Chir. repurg. §. 1215.

b) L. cit. L. vij. Gap. 16.

c) Chir. repurg. §. 1246. ulte-
rius de hac re vide Bertrandi Trai-
tè des operat: Chirurgie: p. 10 Pe-
ritoneo in dilatationibus parcendum
monet Eller Chir. p. 364. Si sibi-

Ius in vulnera abdominis penetrati
auditur, intestinum læsum est, si
simil Chymus aut feces effluunt,
tanto hoc certius. Bilguer. L. Cit. p.
777. inter signa etiam intestini læsi
est, si prolapsum flaccescere & con-
trahitur.
*) L. c.

Ios i^{ctus} tres erunt lineæ. Ansæ, quæ non, ut in sutura pellionum, adstringuntur; sed adeo laxæ reliquuntur ut manus commode transire possit, & sustinentur ab adjutore, donec factæ sunt pertusiones. Forfice in medio discinduntur ansæ & leniter contorquentur extrema, quæ extra vulnus, quantum sufficit, pertingere debent, emplastro figurantur. Commodius est pro quavis pertusione, singularem habere acum & filum adeo longum, ut peracta sutura, in cavitatem non illabantur. Praestantia hujus methodi præ altera est manifesta. Filum enim una acu contentum, ea longitudine, quæ ad plures sufficiat ansas ampliores, incommodo omnino tractatur, & præterea vulnus acu pertusum ex pertractione longi fili violentam patitur allisionem. Sexto plerumque Nycthemero eximi possunt filamenta, sive cum ægrotus levem intestini sentit titillationem. Quando evolvuntur fila, sollicite cavendum, ne plus quam unicum simul accipiatur filamentum. Si enim duo sumuntur, fieri potest, ut unius futuræ fila apprehendantur, quo facto infirma adhuc consolidatio intestini ad vulnus externum multum pateretur detrimenti. Filamentum etiam inter indicem & pollicem, qui vulneri innituntur, leviter extrahendum.

Intestini plane abscissi & per futuram feliciter curati, exempla prostant. Ulyssipoli, intestinum Ileon, cuiusdam, cultro abscissum, sutura interrupta feliciter sanatum *d).* RAMSDOHR superiorem partem inferiori immittit *e).* BILGUER *f)* idem ad digitum latum fecit & quatuor Nodosæ ligaturis sanavit, sed ita tamen, ut canalis non obturaretur *g).*

Par

d) Philosoph. Trans. vol 50 P. I. 1757.

e) Memoire de l'Academ. R. de Chir.

f) L. c. p. 783.

g) Ad intestinorum immixtionem observari meretur, quod raro hæc succedit. Coarctatur enim canalis, unde non leve ægrotu

Partem intestinorum sphacelo correptorum fuisse abscessam & superiorem intestini extremitatem vulneri exteriori alligatam & per modum ani artificialis sanitam, evincunt exempla.

Si omentum ex vulnere propendeat sphacelo corruptum, prominens amputanda est pars, ligatura *b*) in viva parte facta *i*); sed disvadet PIPELET, ob usum omenti, quod expansum jacere debet. Idem sola vasa ligare jubet; ceterum amputatur omentum.

§. VII.

Quando impetu sanguinem fundit sauciata arteria ad ligaturam confugiendum, que alteram constituit RESTRICTIVARUM *speciem*.

Usitatæ ad hanc inserviunt acus plus minus curvæ, filo latiore aut tenuiore, ut in futuris incarnativis. Si magnæ vulneratæ sunt arteriæ, torcular omnium primo adhibetur, & postea fit ligatura. Minores autem arteriarum rami non sunt subligandi, utpote quibus linteum rasum siccum satisfacit. Ubi osla subjacent, velut in arteria temporali &c., compressio adhibenda.

Ubi vasa admodum sunt rigida, aut cartilaginea *k*) inanis est ligatura. Nec procedit ligatio, ubi vasa fragilia *l*) sunt; nam hæc facile pertransit & sanguis denuo erum-

tur periculum¹, ex. gr. ubi flatus, & quæ sunt reliqua, molestiam creant. In intestinis tenuioribus, tentari hæc potius posset, quam in crassis. Methodus Dñi PERONIER infecti extremitates intestini cylindro chartula lusoria confecto, commendatur.

b) Omenti ligaturam ichorosam secum habere suppurationem VO-

GEL testatur. *Abhandlung von brychen p. 198. & seqq.*

i) POUTEAU Observ. variae, 162.

k) D: Theden in tympanatio femore amputato, arteriam inveniebat ossarem, cui optimo cum successu turundam intrusit.

l) Si partes putredine ita sunt corruptæ, & ligatura vasculum non retinet, Spongia Quercina, cuius

erumpit, atque hæmorrhagias sæpe efficit lethales. Nec ubi spasmi accedunt *m*).

PARÆUS & ante eum multi ad ligandas arterias adhibuerunt forcipem *n*), in apice tenuorem aut latiorrem, in hunc finem factum, & multum musculosi simul in ligaturam adlumferunt: sed hanc vasa subligandi rationem inanem GOURMALIN censebat, unde multa hos inter orta est controversia. BROMFIELDT & alii Chirurgi Angli forcipem cum successu adhibuerunt. WHITE majora tantum vasa BROMFIELDI methodo ligat. THEDEN in *observat*: suis usum forcipis arteriæ prorsus dam-

usum reduxit BROSSARD, sistitur sanguis. Suo damno, insufficien-
tiam ligaturæ, talibus in casibus, se expertum esse fatetur WARNER *casus in Surgery &c.* De spon-
gia querina Prof. O. Acrel in Act.
litt. Scient: Holm 1755. etiam in ob-
serv. Chirurg. p. 331. plurimas ad-
duxit observationes, *ibidem* p. 109,
110. usum spongiae ceratae docet,
& quomodo adhibenda, exponit.

m) Post amputationem brachii in Nosodochio Wiennensi observavit Dn. FLEURANT, ægrotum statim post peræstam ligaturam, quaestum esse dolorem intolerabilem, qui per horulæ spatium ita excrevit, ut vehementissimæ sequentur convulsiones: coactus igitur ligaturam forcice discindere, non sine admiratione vidit nullum prodire sanguinem. Explicat hoc phenomenon POUTEAU in suis *observ.* & *aliter van SVIETN* in *Commentat.* in BOERHAAUE *aphor.* 218. ubi ostendit arterias post li-
gaturam connivere. THEDEN in suis

Observat. narrat virum per totam vitam factum epilepticum, ex ligatura arteriæ spermaticæ cum nervo. Plures vident convulsionibus correptos. HEUERMAN *operat. Chirurg.* in ejusmodi casu, nunquam instituendam esse dicit ligaturam, ob nervum ab arteria discernendi & separandi difficultatem. WHITE igitur Warneri sequitur consilium, & pri-
mum arteriam sperm. inter digitos terit & deinde molli carpo tegit linteo. Non ligaturam nervi solam esse causam POUTEAU credit, sed etiam tensionem partium in ligatura simul comprehensarum multum con-
ferre haud ex vano judicat. SOUVA-
GESIUS in causas trismi traumatice ita differit: nec non a brachio aut pede amputato, cum nervi a ligatura sunt constricti. ejusd. Nasolag. Me-
tbod. Tom. 2. Pars 2 p. 14.

n) Varias habet HILDANUS, talium forcipum figuræ. Cfr. Ob-
servat. de gangr. & Sphacelo Cap.
19.

damnat. Postquam enim in amputatione vidit arteriam se retrahentem & sanguinis fluxum cessantem, nullam ligavit inde arteriam. Præterea ubi arteria non satis profunde apprehenditur, inopinato ligatura vacillare potest. Nec nimis arte constringenda est ligatura; alias enim separatur, antequam connivere potuit arteria. Hinc contendit POUTEAU ^{a)}, arteriam saltem sex lineas ab aperitura esse ligandam, ubi suppuratio certe ligaturam non efficit fallacem. Addit FLEURANT: quo latior ligatura eo melior; sed LOUIS ligaturam sic justo diutius remanere observavit ^{p).}

TANTUM.

^{a)} in *Observat. var.* p. 279. 316.

^{p)} *Journ. Medic. per Roux*
T. XXXII.



Experientissime AUCTOR.

Dum pro Doctoribus in Medicina honoribus, adeo ex merito Tibi conferendis, Reipublice Litterariorum ultimum tradis Specimen, facere non possum, quin, aliquid saltem, tenerrimi mei in Te affectus testimonium Tibi persolvam.

Si in lætitia declaranda, qua ex prospero rerum Tuarum successu capior, calamus meus animi rite ageret interpretem, elegans certe Tibi jam obtingeret gratulatio, sed & rudior mea aliquid forsan habet, quo Tibi sese probet, nam gratulabundus animus, qualis erga Te meus, facilius sentitur quam describitur.

In medio autem gaudii doleo. Abit enim ad exterios meus BOECLER; utinam illius praesentia nimis longo tempore non sit desideranda! At eadem permanet BOECLERI amicitia, & abit in sui & Patriæ utilitatem.

Maneant Te premia Tua doctrina, & hominum levandi miseras ardore digna! Cedat Tibi peregrinatio jamjam instituenda felicissime! Patria olim non obliviscetur sui commodi ergo suscepti laboris. Vale integrime amice, & esto semper persuasus, quod summum attingas felicitatis culmen, si ita Tibi procedant omnia, ut eximo pectoris optat

Tuus

N. AURIVILLIUS.

